

## PROPANO® AF

### Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego oraz przedmiotów mających kontakt z żywnością

**Przeznaczenie:** Szybka dezynfekcja odpornych na działanie alkoholu małych powierzchni i sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych i ginekologicznych. PROPANO AF przeznaczony jest do dezynfekcji foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej, blatów, parapetów, szyb, desek, klamek i innych trudno dostępnych powierzchni. Ze względu na specjalną formułę i łatwość użycia zalecany jest również do dezynfekcji specjalistycznych narzędzi dentystycznych takich jak prostnice i kątnice oraz mas do wycisków. Preparat może być stosowany do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością. Pełna skuteczność dezynfekcji potwierdzona już po 30 sekundach działania.

- Nie zawiera aldehydów – nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Nie zawiera czwartorzędowych związków amonowych
- Nie podrażnia dróg oddechowych
- Łagodny dla materiału (wysoka tolerancja materiałowa)
- Nie wymaga wycierania, nie pozostawia śladów i smug

**Skład:** 100 g zawiera: 40,50 g etanol; 9,20 g propan-1-ol

**Spektrum i czas działania:**

Spektrum		Obciążenie		Czas działania
		bez	z obciążeniem	
Bakterie, grzyby <sup>1</sup>		x	x	30 sekund
Tbc <sup>2</sup> , MRSA		x		
			x	1 minuta
Wirusy	HBV / HIV / HCV	x	x	30 sekund
	Adenovirus	x	x	
	Rotavirus	x	x	
	Vacciniavirus	x	x	
	Herpes	x	x	
	Grypa (z H5N1)	x	x	
	SARS	x	x	

<sup>1</sup> dezynfekcja powierzchni wg DGHM

<sup>2</sup> *M. terrae*

**Sposób użycia:** Powierzchnię i urządzenia spryskać z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia. Dezynfekcja mas do wycisków: całkowicie zanurzyć w preparacie PROPANO AF, obrócić w celu równomiernego zwilżenia powierzchni, wyjąć z wanny dezynfekcyjnej i pozostawić do wyschnięcia.

**Opakowanie:** butelka 1 l ze spryskiwaczem, kanister 5 l

**Uwagi:** Opinie: Prof. Dr H.-P. Werner, Schwerin; Prof. Dr R. Schubert, Frankfurt/M.; Dr J. Steinmann, Bremen; Prof. Dr A. Kramer, Greifswald.

- Zawiera alkohole. Sprawdzić tolerancję materiałową. Nie stosować do szkła akrylowego
- Produkt łatwopalny. Punkt zapłonu wg DIN EN ISO 3679 - 30°C.
- Działa drażniąco na oczy.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu i nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.
- Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.

CE 0124

Preparat wpisany na listę DGHM. Wyrób Medyczny zarejestrowany zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG.